


# Zwangere vrouw met mogelijk COVID 19

RIVM criteria <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>



## Opname in ziekenhuis

**Maternaal:** Vitals: #Temp, HF, RR, AH, saturatie, bewustzijn, urineproductie (MEWS) a 1 uur. Spoed interventie team (SIT) inroepen volgens lokaal protocol.

**Lab:** Bloedkweken, bloedbeeld: leuko diff, CRP, elektrolyten, arterieel bloedgas, lactaat, glucose, D-Dimeer, nierfunctie, leverfunctie (ASAT, ALAT, LDH, Bilirubine en CK).

**Beeldvorming:** Pulmonale diagnostiek (X thorax of CT thorax).

**Management:** Nacl infuus 2-3 L. Corticosteroïden op foetale indicatie <34 weken. IV antibiotica volgens lokaal protocol

**Foetaal:** Harttonen of CTG (afh van termijn), groei/dopplers op indicatie

## ALARMSYMPTOMEN

SEPTISCHE SHOCK, MULTI ORGAAN FALEN, FOETALE NOOD <https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/medicamenteuze-behandelopties>

## BEVALLING > 24 weken

Dit geldt alleen als moeder COVID-19 heeft en ziek is of in thuisisolatie en niet 24 h klachtenvrij

Isolatie volgens lokale afspraken

Geen contra-indicatie vaginale bevalling

Saturatie a 1 uur

CTG bewaking durante partu

Laat afnavelen

Kind afvegen

Kind opnemen bij moeder in sluiskamer, tenzij opname indicatie neonat om andere reden

SARS-CoV-2 RT-PCR van de neonat

Placenta naar PA na afname SARS-CoV-2 RT-PCR met vraagstelling tekenen infectie

Borstvoeding met mondkap en hygiëne maatregelen (handen wassen voor het aanraken van de baby, borsten, eigen borstkolf of fles)

Goed schoonmaken van eigen borstkolf na gebruik

Overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven

\* Als patiënte te instabiel bevallen op locatie en kind ophalen door NICU

\*\* Bij vragenover Nethoss registratie; [info@nethoss-perined.nl](mailto:info@nethoss-perined.nl)