

Neonaat postpartum  
(verdachte)  
COVID-19 positieve moeder

OPVANG (aparte kamer/OK/VK)  
Isolatie conform lokaal beleid

Neonaat  
zonder indicatie  
voor opname

Neonaat  
met indicatie  
voor opname

Moeder  
milde/matige klachten

Moeder  
ernstig ziek

Ouders mogen  
op bezoek na 24 uur  
klachtenvrij te zijn.

Neonaat met  
respiratoire  
ondersteuning

Neonaat zonder  
respiratoire  
ondersteuning

Neonaat  
mag bij moeder in  
(thuis)-isolatie  
met instructies\*  
en follow up\*

Shared decision making  
Opties:  
1. Neonaat naar huis  
andere verzorger met  
instructies\*  
en follow up\*  
2. Opname in isolatie#

**Isolatie**  
Incl. FFP2-masker

**Isolatie**  
Chirurgisch masker

Duur isolatie:  
Optie 1: 14 dagen= incubatietijd (indien neonaat geen klachten)  
Optie 2: Dag 4 en dag 7: Test nasopharynx+ faeces. Indien alle 4 negatief:  
beschouwen als negatief (nog kleine kans op ontstaan klachten tot 14 dagen pp)  
Indien 1 van de 4 positief: beschouwen als positief

# \*Instructies ouders

- Doel: preventie van transmissie van positieve ouder naar neonaat
- Uitleg: er is een kans dat het kind ook COVID-19 ontwikkelt tot 14 dagen nadat ouder 24 uur klachtenvrij is geworden. Bij klachten neonaat laagdrempelig contact opnemen.
- Afstand in dezelfde ruimte van ten minste 1,5 meter
- Zorg en/of voeden o.b.v. shared decision making (ernst klachten) mogelijk met maatregelen van goede handhygiëne en dragen van chirurgisch mondmasker. Soms wenselijker dat de zorg/voeding tijdelijk door iemand anders gedaan wordt. Geen contra-indicatie voor het geven van moedermelk al dan niet gekolfd.
- Telefonische follow up bij naar huis gaan en instructies wat te doen bij klachten neonaat (atypische klachten als kreunen, koorts, verkouden, niet drinken e.d.)

# Uitgangspunten

- Bij een zwangere met COVID-19 rond de bevalling zijn tot nu toe geen sterke aanwijzingen voor verticale transmissie hoewel enkele publicaties dit wel suggereren. Modus partus lijkt hierop niet van invloed.
- Doel van de isolatiemaatregelen en instructies voor ouders is het voorkomen van horizontale transmissie van moeder naar kind en van patiënte (kind en ouder) naar de zorgverlener.